

Nytjaplöntur á Íslandi 2009

**Yrki, sem mælt er með til ræktunar í landbúnaði,
garðrækt og landgræðslu**
*Varieties recommended for use in Icelandic
agriculture and land reclamation*

Útgefendur/Publishers:
Landbúnaðarháskóli Íslands

Ritstjórn:
Þórdís Anna Kristjánsdóttir

Mars 2009

Efnisyfirlit (*Index*)

Túnrækt (<i>Herbage plants</i>)	3
Garðflatir (<i>Amenity grasses</i>)	5
Uppgræðsla (<i>Land reclamation</i>)	5
Korn til þroska (<i>Cereals</i>)	7
Grænfóður (<i>Green fodder crops</i>)	8
Garðávextir (<i>Potatoes and swedes</i>)	10
Ber (<i>Berries</i>)	10
Listi yfir kynbótafyrirtæki / eigendur (<i>Breeders / owners of the cultivars</i>)	12

Túnrækt (*Herbage plants*)

Vallarfoxgras (*Phleum pratense* L.)

Vallarfoxgras er afbragðsgott fóðurgras, sé það slegið við skrið, en endist betur ef seinna er slegið.

Adda	Lbhí	Sprettur vel fyrri hluta sumars, en lítið eftir fyrsta slátt.
Bodin	Gram.	Norskt staðaryrki (Local cultivar). Tæplega eins þolið og uppskerumikið og Adda, Engmo og Korpa.
Engmo	Gram.	Norskt staðaryrki (Local cultivar). Vetrarþolið, en sprettur lítið eftir slátt.
Grindstad	TG	Hentar þar sem sumar er langt, en vetrarþol ekki mikið.
Jonatan	SW	Sæmilega vetrarþolið. Uppskerumikið og gefur viðunandi endurvöxt.
Korpa	Lbhí	Mjög vetrarþolið yrki. Sprettur vel fyrri hluta sumars, en lítið eftir fyrsta slátt.
Noreng	Gram.	Líkist Vega. Uppskerumikið og gefur ágætan endurvöxt.
Snorri	Lbhí	Afrakstur samnoræna kynbóta. Valdar plöntur héðan og úr nyrstu héruðum grannlandanna. Vetrarþolið og uppskerumikið.
Vega	Gram.	Uppskerumikið og gefur meiri endurvöxt en önnur vetrarþolin yrki.

Túnvingull (*Festuca rubra* L.)

Túnvingull er ekki gott fóðurgras og ætti ekki að nota í almennar sáðblöndur. Hins vegar getur hann átt rétt á sér þar sem hætta er á þurrkum og ætti þá að sá honum einum.

Gondolin	DLFT	Mjög lítið prófað hér á landi.
Leik	Gram.	Getur verið aðgangshart í blöndu með vallarfoxgrasi. Mikill puntur.
Reptans	SW	Gamalt yrki, þrautreynt.
Rubin	SW	Gamalt yrki, þrautreynt.

Vallarsveifgras (*Poa pratensis* L.)

Vallarsveifgras er skriðult gras sem myndar þéttan grassvörð og lokar eyðum. Það er gott fóðurgras og oftast notað í blöndu með vallarfoxgrasi.

Fylking	SW	Lítill puntur, tiltölulega jöfn spretta allt sumarið.
Lavang	Gram.	Mikill puntur, skrífður snemma.
Primo	SW	Gamalt yrki, þrautreynt.
Sobra	SW	Gamalt yrki, þrautreynt.

Beringspuntur (*Deschampsia beringensis* Hult.)

Beringspuntur er með veikt rôtarkerfi fyrstu árin og opinn svörð. Hann þolir illa beit og frostlyftingu. Hann hentar best í hreinrækt í sand- og mýrarjarðvegi og er mjög vetrarþolinn.

Origin Norcoast Lbhí

Hálíngresi (*Agrostis capillaris* L.)

Hálíngresi er miðlungi gott fóðurgras og sprettur seint úr sér.

Leikvin	Gram.	Vetrarþol ekki alveg fullnægjandi.
Nor	Gram.	Uppskerumikið af língresi að vera. Vetrarþol viðunandi.

Háliðagras (*Alopecurus pratensis* L.)

Háliðagras sprettur og skríður mjög snemma og þarf því að slá snemma. Það gefur góðan endurvöxt. Fram að þessu hefur einungis verið ókynbættur efniviður á markaði en nú eru í prófun kynbætt yrki.

Alko	BPG	Lifir þokkalega og gefur ágæta uppskeru.
------	-----	--

Axhnoðapuntur (*Dactylis glomerata*)

Axhnoðapuntur er fljótur til á vorin, uppskerumikill og gefur góðan endurvöxt. Ekkert sérstakt fóðurgras, en gæti hentað í vorbeit fyrir sauðfé.

Apelsvoll	Gram.
Hattfjellidal	Gram.

Vallarrýgresi (*Lolium perenne* L.)

Vallarrýgresi er mjög breytileg tegund. Það er uppskerumikið og gott fóðurgras, sem má slá eða beita. Það er ekki vetrarþolið við íslenskar aðstæður, en snemmsprottið rýgresi getur hentað í sáðskipti við bestu skilyrði. Ferlitna rýgresi er gæðameira en tvílitna, en þolið er minna.

Birger (4n)	SW	Lítið reynt hérlandis. Ekki eins vetrarþolið og Svea.
Liprinta (2n)	Lip.	
Svea (2n)	SW	Mjög snemmsprottið og tiltölulega vetrarþolið.
Tetramax (4n)	DLFT	

2n=tvílitna, 4n=ferlitna.

Hávingull (*Festuca pratensis* Huds.)

Hentar vel til að slá tvisvar, en þolir illa svellalög. Hávingull gæti verið heppilegur til ræktunar í sáðskiptum og í blöndu með rauðsmára.

Norild	Gram.	Norðlægt yrki. Gefur a.m.k. jafn mikla uppskeru og Salten.
Salten	Gram.	Gamalt yrki, þrautreynt.

Rauðsmári (*Trifolium pratense* L.)

Rauðsmári hentar í blöndu með grasi í forþurrkað vöthey.

Betty (4n)	SW
Bjursele (2n)	SW

2n=tvílitna, 4n=ferlitna.

Hvítsmári (*Trifolium repens* L.)

Hvítsmári hentar einkum í beitartún í blöndu með grasi.

Norstar	Gram.	Hefur reynst vel í tilraunum.
Snowy	Gram.	Lítið reynt yrki.
Undrom	SW	Gamalt yrki, þrautreynt.

Garðflatir (*Amenity grasses*)

Hálingresi (*Agrostis capillaris* L.)

Bardot	Bar.	Í golfflatir, ekki vetrarþolið.
Nor	Gram.	

Vallarsveifgras (*Poa pratensis* L.)

Conni	DLFT	Þolið og gefur fallega flöt.
Julia	Inno.	
Miracle	Inno.	Í golfflatir, ekki vetrarþolið.

Túnvingull (*Festuca rubra* var. *commutata*)

Bargreen	Bar.
Center	Inno.
Olivia	EuroG.

Vallarrýgresi (*Lolium perenne* L.)

Vallarrýgresi er fljótt til og þekur vel. Í garðflatir er það notað með þolnum grastegundum til þess að fá fram þekju á fyrsta sumri. Hlutur þess má ekki vera mikill, því að það hverfur eftir einn til þrjá vetur og skilur þá eftir eyður. Einkum er stuðst við niðurstöður frá Noregi.

Livonne	Lip.	
Mondial	AS	
Ronja	SW	Tekur flestum yrkjum fram árið eftir sáningu í Mið- og Norður-Noregi.

Uppgræðsla (*Land reclamation*)

Við uppgæðslu þarf að velja tegundir og yrki með hliðsjón af aðstæðum og markmiði uppgæðslunnar. Svæði sem á að græða einkennast oft af frostlyftingu og næringarskort og markmiðið er að binda yfirborðið. Yrki á þessum lista geta líka hentað til ræktunar grasflata, þar sem ekki er búist við mikilli umhirðu.

Ef óskað er eftir þekju samsumars má nota skammlífari tegundir og yrki úr túnræktar- og grasflatalista. Þau munu hopta fyrir innlendum gróðri.

Túnvingull (*Festuca rubra* L.)

Angela	DLFT	Ekki prófað á Íslandi.
Center	Inno.	Ekki prófað á Íslandi.
Cindy	Inno.	Ekki prófað á Íslandi.
Frigg	Gram.	Uppskerulítið yrki, fremur gisið. Talið geta komið í stað Leik í Noregi. Ekki prófað á Íslandi.
Koket	AS	Álitlegt skv. norskum tilraunum. Fremur uppskerumikið. Ekki prófað á Íslandi.
Leik	Gram.	Óflugt yrki til uppgæðslu, en verður gisið þar sem frostlyfting er.
Sámur	LbhÍ	Myndar góða þekju og hamlar frostlyftingu sæmilega.
Wilma	SW	Ekki prófað á Íslandi.

Vallarsveifgras (*Poa pratensis* L.)

Fylking	SW	Harðgert og þurrkþolið og myndar þéttan svörð.
Lavang	Gram.	Harðgert og þurrkþolið og myndar þéttan svörð.

Beringspuntur (*Deschampsia beringensis* Hult.)

Beringspuntur hefur reynst næstur melgresi í þoli á sandsvæðum. Hann er þurrk- og vetrarþolin, en þolir frostlyftingu illa.

Origin Norcoast LbhÍ

Melgresi (*Leymus arenarius* L. Hochst.)

Fræi er safnað af nokkrum staðarafbrigðum og notað til að hefta sandfok.

Snarrótarpuntur (*Deschampsia caespitosa* L.)

Snarrót er ekki eftirsóknarverð í tún. Hún getur hins vegar auðveldlega sáð sér inn í tún bænda frá vegköntum. Þess vegna ætti ekki að nota hana á láglandi og ekki á svæðum þar sem lítið er af henni. Ekki eru til viðurkennd yrki af snarrót. Fræ er tekið af staðarafbrigðum af ótilgreindum uppruna.

Sauðvingull (*Festuca ovina* L. var. *duriuscula*)

Sauðvingull myndar þetta gróðurmottu, sem bindur yfirborðið vel og hamlar frostlyftingu. Lítið bitinn er líður á sumarið. Sauðvingull hentar líka vel í grasflatir, þar sem umhirða er lítil.

Bardur	Bar.	Fremur fljótt til og sæmilega vetrarþolið við erfið skilyrði.
Quatro	Inno.	Fremur fljótt til og hamlar frostlyftingu vel. Ekki þolið við erfið skilyrði.

Alaskalúpína (*Lupinus nootkatensis* Donn ex Sims)

Niturbindandi tegund sem getur orðið kröftug í rýru landi, harðger og vetrarþolin. Lúpína getur breytt gróðursamfélögum komist hún í þau. Tegundina ætti ekki að nota í grennd við þjóðgarða og önnur friðlýst svæði.

Mela LbhÍ / Lr Óvalið íslenskt yrki.

Korn til þroska (*Cereals*)

Bygg (*Hordeum vulgare* L.)

Yrki af sexraðabyggi (6r) þroskast fyrr en yrki af tvíraðabyggi (2r) og nýta því vel stuttan vaxtartíma, en hættir til að tapa korni, brotna og leggjast.

Erkki (6r)	Bor.	Miðlungi fljótþroska. Hentar norðanlands.
IsLómur (6r)	Lbhí	Lágvaxið, veðurþolið og fljótþroska. Hentar á þunga jörð og sérstaklega norðanlands.
IsSkúmur (6r)	Lbhí	Lágvaxið, veðurþolið og miðlungi fljótþroska. Hentar á sandjörð og sérstaklega sunnanlands.
Judit (6r)	SW	Nýtt sænskt, fljótþroska og uppskerumikið. Hentar vel norðanlands.
Kunnari (6r)	Bor.	Fljæotþroska. Þolir vind betur en mörg sexraða yrki.
Olsok (6r)	Gram.	Norskt, þrautreynt hérlendis. Skríður ekki snemma, en skilar velþroskaðri uppskeru. Hentar vel á sendið land norðanlands og hefur reynst nokkuð vel í uppsveitum sunnanlands.
Tiril (6r)	Gram.	Nýtt norskt, fremur fljótþroska. Hentar norðanlands.
Barbro (2r)	SW	Áþekkt Filippu. Hentar sunnanlands.
Filippa (2r)	SW	Sænskt, þrautreynt hérlendis. Fremur seinþroska og hentar ekki norðanlands. Þolir súra jörð. Á best heima á mýrlendi sunnantil á landinu. Bognar í haustveðrum, en brotnar ekki.
IsKría (2r)	Lbhí	Nýtt íslenskt yrki, líkt Skeglu. Lítið eitt seinna til þroska en Skegla, lægri á vöxt, en skilar 10% meiri uppskeru. Ætti að geta gengið nokkuð víða á landinu.
Saana (2r)	Bor.	Finnskt, seinþroska en strásterkt og stendur vel fram eftir hausti. Saana hentar aðeins þar sem hægt er að sá snemma og sumarið er langt.
Skegla (2r)	Lbhí	Íslenskt. Mjög fljótþroska. Á helst heima í uppsveitum sunnanlands, í Hornafirði og sums staðar á Norðurlandi. Í lágsveitum sunnanlands reynist Skegla óþarflega fljótþroska og notar ekki allan vaxtartímann.

Hafrar (*Avena sativa* L.)

Hafrar eru nokkuð seinni til þroska en bygg, en gera minni kröfur til jarðvegs. Henta best á sandjörð sunnanlands, hafa af einhverjum sökum aldrei náð sér á strik norðanlands.

Aslak	Bor.	Fljótast hafrayrkja, sem hér hafa verið reynd.
Cilla	SW	Nokkuð fljótþroska, uppskerumikið.
Gere	Gram.	Nýtt, fljótþroska yrki.

Vetrarhveiti (*Triticum aestivum* L.)

Sáð í júlí–ágúst. Hentar einungis þar sem vetrarveðrátta er mildust og sumarið langt.

Björke	Gram.	Tiltölulega vetrarþolið og fljótþroska. Meðaluppskera.
Mjölner	SW	Tiltölulega vetrarþolið, heldur seinþroska.
Stava	SW	Miðlungi vetrarþolið, uppskerumikið.
Urho	Bor.	Tiltölulega vetrarþolið og fljótþroska, ekki uppskerumikið.

Vetrarrúgur (*Secale cereale*)

Sáð í júlí–ágúst. Mun vetrarþolnari en vetrarhveiti.

Kaskelott	SW	Reynt í tilraunum á Korpu. Vetrarþol þar viðunandi og uppskera ágæt.
-----------	----	--

Grænfóður (*Green fodder crops*)

Grænfóðuryrkin hafa flest lítið verið reynd í innbyrðis samanburði, en að nokkru leyti er miðað við erlendar niðurstöður, einkum norskar. Sum hafa verið ræktuð hérlandis um árabil.

Bygg (*Hordeum vulgare* L.)

Edel (6r)	Gram.	Hávaxið, seint.
Orthegea (2r)	SSD	Hávaxið, seint.

Hafrar (*Avena sativa* L.)

Sumaryrki vaxa hraðar en vetraryrki fyrri hluta sumars, en tréna þegar kemur fram á haustið. Sumaryrki standa sig betur en vetraryrki í samkeppni við illgresi. Sumaryrki þarf að slá snemma en vetraryrki mega bíða sláttar fram eftir sumri.

Sumaryrki:

Belinda	SW	Miðlungi seint.
Markant	Wier.	Seint til þroska.

Vetraryrki:

Jalna	Mon.	Mjög seint til þroska.
Peniarth	PBI	Mjög seint til þroska.

Vetrarrúgur (*Secale cereale* L.)

Sáð í júlí–ágúst, notað til beitar í maí–júní.

Riíhi	Bor.	Vetrarþolið, hávaxið, sprettur ört snemma vors.
-------	------	---

Einært rýgresi (*Lolium multiflorum* Lam.) (2n=tvílitna, 4n=ferlitna)

Sumaryrki (var. *westerwoldicum*):

Andy	DLFT	Ferlitna.
Barspectra	Bar.	Ferlitna.
Clipper	DLFT	Ferlitna.
Condado	EuroG.	Ferlitna.
Major	Inno.	Ferlitna.
Wesley	AS	Ferlitna.

Vetraryrki (var. *italicum*):

Ajax	DLFT	Ferlitna.
Barextra	Bar.	Ferlitna.
Barmultra	Bar.	Ferlitna. Blaðríkt, en fremur seint.
Danergo	DLFT	Ferlitna.
EF 486 Dasas	DLFT	Tvílitna.
Macho	EuroG.	Ferlitna.
Mondora	AS	Ferlitna.
Tonic	DLFT	Ferlitna.

Fóðurhreðka (*Raphanus sativus* L. var. *oleiferus*)

Siletina	GSSG
Siletta Nova	ASP

Fóðurmergkál (*Brassica oleracea* L. var. *acephala*)

Grüner Angeliter	ASP
Maris Kestrel	PBI
Marrow Stem	SISL

Fóðurnæpa (*Brassica rapa* L. var. *rapifera* Metzg.)

Civasto R	EuroG.	Tvílitna
Marco	EuroG.	Ferlitna. Tiltölulega lítil hætta á stöngulmyndun.
Vollenda	EuroG.	Ferlitna. Tiltölulega lítil hætta á stöngulmyndun.

Fóðurrepja (*Brassica napus* L. var. *oleifera* DC)

Vetraryrki:

Akela	Feld.	Dvergafbrigði, stöngull þess lengist nær ekkert og það er ávallt lágvaxið. Það ætti ekki að nota, ef einhver hætta er á arfa.
Barcoli	Bar.	
Delta	SW	
Emerald	DANI	
Hobson	AS	Blaðríkt. Hættir lítið til að blómstra.
Sigma	SW	

Fóðurnepja (*Brassica rapa* L. var. *oleifera* DC)

Vetraryrki:

Largo	SW
-------	----

Flækjur (*Vicia sativa* L.)

Eingöngu ræktaðar í blöndu með höfrum.

Nitra	Bar.
-------	------

Ertur (*Pisum sativum* L.)

Eingöngu ræktaðar í blöndu með höfrum.

Bohatyr	Oseva
Rif	Bar.
Timo	SW

Einær fóðurlúpína (*Lupinus* spp.)

L. luteus (gul)

Juno	Poz.
------	------

L. angustifolius (blá)

Sonet	Poz.
-------	------

Garðávextir (Potatoes and swedes)

Kartöflur (*Solanum tuberosum*)

Belana	EP	Grunn augu, margar kartöflur undan grasi. Tiltölulega hátt þurrefni.
Gullauga		Í innlendri stofnrækt.
Helga (Rautt Gullauga)		Í innlendri stofnrækt.
Premiere		Í innlendri stofnrækt.
Rauðar íslenskar		Í innlendri stofnrækt.

Gulrófur (*Brassica napus L. rapifera* Metzg.)

Mariúbakkarófa	LbhÍ
Sandvíkurrófa	HJ
Vige	Log

Ber (*Berries*)

Jarðarber (*Fragaria x ananassa*)

Útiræktun jarðarberja er möguleg hér á völdum stöðum. Gróðurreitir og akríldúkur flýta fyrir uppskeru. Yfirbreiðsla yfir blómgunartíma veldur lélegri frjóvgun. Yrkjunum er raðað eftir því hve fljótt þau þroska ber Þau fyrstu frá um 20/7–20/8. Hin seinni frá því um 30/7- og fram í frost.

Glima	Norskt	Snemþroska harðgert yrki. Planta fremur smá. Ber miðlungsstór, vel löguð, bragðgóð með súrum keim. Þroskar ber frá um 20/7. Uppskerumikil allt að 500 gr. á plöntu.
Jonsok	Norskt	Harðgert yrki meðalsnemþroska en seinna en Glima. Þolið gegn mjöldögg og grámyglu. Ber meðalstór.
Zephyr	Danskt	Harðgert yrki, litlar plöntur. Fremur snemþroska. Ber meðalstór til stór með súrum keim. Viðkvæm fyrir mjöldögg.
Korona	Hollenskt	Stórar uppréttar plöntur. Seinþroska. Þroskast illa í köldum árum. Ber mjög stór og vel löguð, sæt og bragðmikil. Plöntum hættir við kali.
Bounty	Kanadískt	Plöntur stórar. Hefur reynst vel í útiræktun í Eyjafirði. Frekar seinþroska. Berin eru stór, vel löguð, sæt og dökkrauð.

Rifsber (*Ribes x pallidum* og *Ribes rubrum*)

Rifsber eru samheiti á bæði tegundum og tegundablendingum.

Rauð hollensk , <i>R x pallidum</i>	Gamalreynt yrki sem hefur verið í ræktun á Íslandi frá a.m.k. um 1830. Þroskar ber vanalega um og eftir mánaðarmót ágúst/september. Uppskera getur brugðist norðanlands í köldum sumrum.
Hvít hollensk , <i>R x pallidum</i>	Með gulhvít ber og sætari á bragðið en Rauð Hollensk. Harðgert á Suðurlandi og gefur ágæta uppskeru í skjóli.
Jonkheer van Tets , <i>R. rubrum</i>	Hollenskt yrki. Harðgert á Suðurlandi og gefur góða uppskeru á skjólsælum stöðum. Gaf álíka eða betri uppskeru og Rauð hollensk í tilraunum á Möðruvöllum í Eyjafirði en kól meira. Langir berjaklasar og stór ber.

Sólber (*Ribes nigrum*)

Fjöldi gamalla og nýrra yrkja af sólberjum gefur kost á að velja yrki eftir þroskatíma berja, bragði, stærð og hentugleika til notkunar. Bragð og þéttleiki sólberja er mjög mismunandi og henta því ýmist til sultugerðar, frystingar eða að vera etin beint af runnanum. Þroskatími er frá lokum júlí til loka ágúst.

Melalahti	Finnskt	Upprétt og sterklegt vaxtarlag. Mjög harðgert og snemþroska yrki. Mikil og góð reynsla. Getur kalið í kaldari sveitum og köldum árum norðanlands og austan. Berjaklasar þroskast missnemma á greinum en þeir fyrstu eru mjög snemþroska, hefur því nokkuð langan uppskerutíma. Ber góð til neyslu beint af runna. Hentar ekki til berjaframleiðslu, en vel í heimilisgarða, útivistarskóga og á skólalóðir.
Jänkisjärvi	Finnskt	Upprétt vaxtarlag. Snemþroska, mjög harðgert yrki sem hentar vel norðanlands og austan en er hætt við að lifna snemma og lenda í seinum vorhretum sunnanlands. Mikil uppskera og stór ber.
Sunderbyn II	Sænskt	Snemþroska og harðgert yrki, ónæmt fyrir mjöldögg. Líklega harðgerasta yrki fyrir kaldari sveitir norðanlands og austan en er hætt við að lifna snemma og lenda í seinum vorhretum sunnanlands. Uppskera nokkuð mikil. Ber frekar smá.
Polar	Dafo	Runni uppréttur. Hefur reynst öruggur á höfuðborgarsvæðinu. Ónæmur fyrir mjöldögg og blóm þola næturfrost. Meðalstórir klasar með stórum berjum sem þroskast snemma og jafnt. Mikil uppskera. Berin bragðdauf en henta til sultugerðar og stórframleiðslu.
Nikkala XI	Sænskt	Mjög harðgert yrki en runninn er nær jarðlægur, greinar þarfnast uppbindingar. Mikil og stór ber. Gefur mjög mikla uppskeru en þroskar nokkuð seint. Uppskerumest sólberjayrkja á Möðruvöllum í Eyjafirði.
Öjebyn	Sænskt	Runni uppréttur en greinar leggjast nokkuð mikið niður sérstaklega í niturríkum jarðvegi. Ónæmt fyrir mjöldögg. Getur kalið í kaldari sveitum og köldum árum norðanlands og austan. Blómgast seint og þroskar ber jafnt en fremur seint. Ber stór, bragðmikil og góð. Hentar vel í heimilisgarða.
Storklas	Sænskt	Var kynnt sem endurbætt af Öjebyn í Svíþjóð. Runni uppréttari en Öjebyn en greinar leggjast undan þegar berin þroskast. Ónæmur fyrir mjöldögg. Ber mjög stór en þroskast nokkuð seint. Berin eru braggóð, nokkuð súr og með þykku hýði, henta vel til frystingar og sultugerðar. Góð reynsla á höfuðborgarsvæðinu.

Stikilsber (*Ribes uva-crispa*)

Þroska ber nokkru síðar en rifs, oft ekki fyrir en upp úr miðjum september. Ná ekki þroska í öllum árum. Þau yrki sem ræktuð eru hérlendis eru blendingar milli amerísks stikilsbers (*Ribes hirtellum*) og evrópsks (*Ribes uva-crispa*)

Hinnomäki gul	Einnig kallað Hinnonmäen Keltainen. Þroskuð ber gulgræn. Þolinn gegn mjöldögg. Ber gulgræn með þunnu hýði. Sæt og góð fersk.
Lepaan Punainen	Uppréttur og nokkuð hávaxinn. Nær árviss og mikil uppskera sunnan- og vestanlands. Þolinn geng mjöldögg. Stór brúnrauð ber.
K. F. Packalen	Ber gulgræn til græn. Góð uppskera á höfuðborgarsvæðinu.

Listi yfir kynbótafyrirtæki / eigendur

List of breeders / owners of the cultivars

AS	Advanta Seeds BV, P.O. Box 1, 4410 AA Rilland, Holland.
ASP	Asmus Soren Petersen, Postfach 6, 24976 Langballig, Þýskaland.
Bar.	Barenbrug Holland BV, Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout Gld, Holland.
Bor.	Boreal Plant Breeding, Myllytie 10, 31600 Jokioinen, Finnland.
BPG	Bayerische Pflanzenzucht Gesellschaft EG & Co. KG Elisabethstrasse 38, 80796 Munchen, Þýskaland.
Dafo	Dansk Forskning, Udkærvej 15, Skejby, DK 8200, Århus N.
DANI	DANI, Plant Breeding Div., Loughgall, Armagh N.I., N-Írland, UK.
DLFT	DLF-Trifolium A/S, P.O. Box 19, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge, Danmörk.
EP	Europlant Pflanzenzucht GmbH, P.O. Box 1380, Lüneburg 21303, Þýskaland.
EuroG.	Euro Grass B.V., P.O. Box 26, 6590 AA Gennep, Holland.
Feld.	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, Postfach 111 104, 47812 Krefeld, Þýskaland.
Gram.	Graminor AS, Björke Forsøgsgård, N-2344 Ilseng, Noregur.
GSSG	G. Schneider Saatzucht GmbH, Postfach 6, 24976 Grundhof, Þýskaland.
HJ	Hannes Jóhannsson, Stóru-Sandvík, 801 Selfoss, Ísland.
Inno.	Innoseeds bv, c/o Højerupvej 31, DK 4660 Store Heddinge, Danmörk
Kraj.	Instytut Krajowych Wlokien Naturalnych, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznan, Pólland.
Lip.	Deutsche Saatveredelung, Lippstadt-Bremen, GmbH, Weissenburger Str. 5, D-4780 Lippstadt, Þýskaland.
Log	LOG, Postbox 141, Ökern, N-0580 Oslo, Noregur.
Lr	Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholti, 850 Hella, Ísland.
Mon.	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, Postboks 659, DK-2200 København, Danmörk.
Nick.	Nickerson Seeds Ltd, Joseph Nickerson Research Centre, Rothwell, Lincolnshire, LN7 6DT, England.
Oseva	Oseva UNI a.s., Chocen Na bile 1231, 565 14 Chocen, Tékkland.
PBI	PBI Cambridge Ltd, Maris Lane, Trumpington, Cambridge, CB2 2LQ, England.
Poz.	Poznanska Hodowla Roslin Sp.zoo, z/s w Tulcach 250 B, ul. Kasztanowa 5, 63-004, Tulce, Pólland.
LbhÍ	Landbúnaðarháskóli Íslands, Keldnaholti, 112 Reykjavík, Ísland.
SISL	Sharpe's International Seeds Ltd, Boston Road, Sleaford, Lincs., NG34 7HA, England.
SSD	Scandinavian Seed KB, Box 840, S531 18, Lidköping, Svíþjóð.
SW	Svalöf Weibull AB, S-268 81 Svalöv, Svíþjóð.
TG	Tollef Grindstad, 1890 Rakkestad, Noregur.
Wier	Landbouwbureau Wiersum BV, P.O. Box 8, NL-9670 AA, Winschoten, Holland.